

QUY TRÌNH KỸ THUẬT NUÔI TÔM CÔNG NGHIỆP

1/ Cải tạo ao trước khi thả giống:

- Sau khi ủi ao phải rào lưới xung quanh.
- Lấy nước vào đầy ngâm 3-5 ngày rồi rút nước ra còn 0,3m nước. Sau đó đánh vôi CaO 300kg/ 1000 m², ngâm 3 ngày rút nước ra phơi khô, khoảng 7-10 ngày rồi tiến hành cấp nước vào đầy qua túi lọc 2-3 lớp(tốt nhất là có ao lắng).
- Sau 2 ngày diệt giáp xác(nếu có). Sau đó tiến hành diệt khuẩn **Finishnano** 1kg/ 1000 m³.
- 2 ngày sau đánh **Khoáng Tạt N79** 3kg/1000 m³, vào 1-2 giờ sáng.
- Ngày hôm sau tiến hành cấp vi sinh gây màu nước **TA-GOLD** 1kg+ 5kg cám+ 3 kg đậu nành+ 3 kg mật đường, ủ 48-72 giờ tạt lúc 8-9 giờ sáng cho 1000m³ nước.
- Trước khi thả giống 2 ngày, đánh vi sinh **TA-PONDPRO** 0,5 kg /1000 m³ vào 4-5 giờ chiều.
- Xem lại màu nước và tiến hành thả giống!

2/ Quản lý thức ăn

* Tháng nuôi 1:

- Ngày 1-3: cho ăn 1,2-1,5 kg thức ăn/ 100.000 con post
 - Ngày 4- 10: Mỗi ngày tăng 400 gr(Đối với sú tăng 200 gram)
 - Ngày 11- 20: Mỗi ngày tăng 500 gr(Đối với sú tăng 250 gram)
 - Ngày 21- 30: Mỗi ngày tăng 600 gr(Đối với sú tăng 300 gram)
- (Từ ngày 25 trở về sau thì người nuôi nên kiểm tra sàng để canh lượng thức ăn cho phù hợp(có thể bỏ vào sàng 3g/ 1kg thức ăn, canh 2 giờ đồng hồ)
- Nên kết hợp cho ăn bộ 4 dinh dưỡng ngay từ ngày đầu thả nuôi(bao gồm: T-FOOD, TA-FEEDMIN, TA.BETA-GLUCAN, TA-FOREVER và áo bọc thức ăn bằng TA-BINDER).

3/ Sử dụng vi sinh trong quá trình nuôi

- Thường xuyên kiểm tra độ kiềm đạt 80-160 mg/lít; độ pH 7,5- 8,5; độ trong 30- 40 cm...để kịp thời có hướng xử lý.(Sử dụng định kỳ **Khoáng Tạt N79** 3kg/1000 m³)
- Nên đánh định kỳ vi sinh **TA-PONDPRO** 0,5kg/1000 m³ nước 5-7 ngày/ lần.

4/ Phòng trị một số bệnh thường gặp:

Câu 1: Tôm bình thường, nước bình thường:

Sử dụng *Khoáng N79* và Vi Sinh *TA-Pondpro* 5-7 ngày/lần.

Liều lượng : vi sinh *TA-Pondpro* 0,5kg + *Khoáng N79* 1-2kg/1000m³/ 2-3 giờ sáng.

Câu 2: Tôm kéo đàn, rong mé (Nước trong hoặc không trong, có tảo sợi hoặc không có tảo sợi). **Cách Trị :** 4 giờ chiều tạt 5kg *EDTA*/1000m³. 2 -3 giờ sáng tạt 3kg *Khoáng N79*/1000m³. Ủ 5 lít nước + 0,5kg *TA-Pondpro* +1kg *TA-Betaglucan*/ 1000m³(Ủ từ 12-24 giờ trước khi tạt).sử dụng lúc 8-9 giờ sáng, có thể sử dụng 2-3 lần ngày cách ngày.

Câu 3: Tảo xanh, tảo lam.

Cách trị : Ủ 6 lít nước với 0,5 kg *TA- Pondpro* + 1kg *TA- Gold*/ 2000m³/1-2 giờ sáng((Ủ từ 12-24 giờ trước khi tạt). Có thể sử dụng 1-3 lần ngày cách ngày.

Câu 4: Tảo đỏ

Cách trị: - 1-3 giờ sáng tạt 5kg *khoáng N79*/1000m³. 12-1 giờ sáng hôm sau cấy 0.5kg *TA-Pondpro*/1000m³ Có thể sử dụng 1-3 ngày liên tiếp.

Câu 5: Tôm bị công thân, mềm vỏ, khó lột, gan yếu.

Cách trị : Cho ăn bộ tứ 10g/kg liên tục(bổ sung thêm Vitamin C 20gram/1 kg TÃ)

- Sử lý môi trường: - **Tạt khoáng N79**, 5kg/1000m³ lúc 2-3 giờ đêm.
- Ủ và cấy 0,5kg vi sinh *TA-Pondpro*/2000m³/2-3 lần.

Câu 6: Tôm bị đón rong, đen mang, mòn đuôi, đứt râu, có khí độc:

Cách trị : - 1-2 giờ sáng tạt 3kg *Khoáng N79*/1000m³

- Ủ và cấy 0,5kg vi sinh *TA-Pondpro*/1000m³/2-5 lần/ ngày cách ngày. Kiểm tra thức ăn thừa hay thiếu.

Câu 7 : Kiểm thấp , có khí độc

Cách trị : 1-3 giờ sáng tạt 5kg *Khoáng N79*/ 1000m³, Ủ và cấy vi sinh *TA-Pondpro* 0,5kg/1000m³

Câu 8 : Nước đục , tảo tàn, có khí độc, tôm vàng mang, tôm ăn yếu.

Cách trị : 8-9 giờ tối tạt 2kg *oxytagen* bột/1000m³

- 2-3 giờ tối tạt 2kg *Oxytagen* bột/ 1000m³
- Cấy vi sinh *TA-Pondpro* + 1 kg *TA-Gold*/ 2000m³/6 lít nước/8-9h sáng.

Câu 9: Tôm chậm lớn, khó lột vỏ, đường ruột nhỏ.

Cách trị : Cho ăn bộ tứ (*T-Food, Ta- Feedmin, Ta-Beta-glucan, Ta-Forever*) + áo dầu áo *Binder* sử dụng 10g/1kg thức ăn/4 cỡ/ ngày.Cấy vi sinh *TA-Pondpro* 0,5kg/2000m³/8-10h sáng.

Câu 10: Tôm bị bệnh đường ruột, gan yếu:

+ Cách trị:

Sử dụng *TA-PONDPRO* 0,5 kg + *T- FOOD* 0,5 kg+ *TA.BETA-GLUCAN* 0,5 kg, ủ 12 giờ, tạt xuống ao cho 1000- 1500 m³ nước vào lúc 4-5 giờ chiều.

Câu 11: Tôm thẻ chết 1 tháng tuổi, bỏ ăn, chết sàng, rớt đáy:

+ Cách trị:

Sử dụng *TA-PONDPRO* 0,5 kg + 0,5 kg *TA.BETA-GLUCAN* /1000 m³ nước, ủ 12 giờ với 4 lít nước, tạt xuống ao vào lúc 8-9 giờ sáng hoặc 4-5 giờ chiều liên tiếp trong 3-5 ngày và không cho tôm ăn(để giảm chi phí, tăng hiệu quả cao thì xả nước ao nuôi ra còn lại 0,8- 1m nước). Khi nào hết chết mới cho ăn lại và cấp nước từ ao lắng qua.

Câu 12: Ao nuôi tôm bị rớt tảo, tôm nổi đầu vì khí độc cao

+ Cách trị:

- o Sử dụng *Oxytagen* 2kg/1.000m² ngay khi tôm nổi đầu(không hòa với nước tạt khô)
- o Sử dụng *Khoáng tạt N79* 3kg/1.000m³ vào lúc 2h sáng và 9h sáng hôm sau cấy vi sinh *TA-PONDPRO* 0,5 kg/1.000 m³ .

5/ Một số điểm cần lưu ý:

- Nên sử dụng vi sinh vào 8-9 giờ sáng hoặc 4-5 giờ chiều và dùng định kỳ 5-7 / lần để có hiệu quả tốt nhất.
- cách ủ vi sinh: lấy 0,5 kg TA-PONPRO với 2 lít nước trong 12-24h không sục khí.
- Khi trộn với T-FOOD, TA.BETA-GLUCAN thì ngâm thêm 3 lít nước.
- Tùy theo mức độ cảm nhiễm mà sử dụng liên tục 2-3 lần.

6/ Điểm nổi bật của quy trình

- Không sử dụng kháng sinh, hóa chất trong suốt vụ nuôi.
 - Thay thế vôi bằng khoáng tạt N79
 - Tôm mau lớn, rút ngắn thời gian nuôi, giảm chi phí.
 - Có thể sử dụng nước trong ao để nuôi tiếp vụ sau.
 - Đạt điều kiện nuôi an toàn vệ sinh thực phẩm.
-

Chúc bà con vụ mùa thành công!

Chi tiết liên hệ:

CÔNG TY TNHH SX & TM TRÚC ANH

Công Điền – Vĩnh Trạch – Bạc Liêu

Điện thoại : 07813.980879 Fax: 07813.980878

Chi nhánh 1: 531/5 Đ. Tôn Đức Thắng, P7, Tp Bạc Liêu.

ĐT : 07813.959 959

Email: trucanh@trucanh.info

website: www.bacsitom-trucanh.com.vn